

Dr. Leonhard Steinbauer

Anbauwürdige Weichselsorten

Im Weichselsortenversuch haben sich die nachfolgend beschriebenen Weichselsorten unter den Anbaubedingungen der Steiermark besonders bewährt. Für jeden Verwendung- und Verarbeitungszweck konnte eine ideale Sorte herausgearbeitet werden.

Gerema	
Synonyme	Geisenheim Klon 14
Abstammung	freie Abblüte aus Kelleris 14, 1981
Entwicklungsstadium Ende April (Schnitt der Jahre)	Ballonstadium
Blühzeitpunkt, Befruchtung	spät, selbstfruchtbar
Wuchseigenschaften	schwach, aufrecht, dichte Krone, geringe Verkahlung
Frucht	mittelgroß, schwarzrot, süß/sauer, platzfest, löst trocken vom Stiel
Reifezeit (Schnitt der Jahre)	Mitte bis Ende Juli
Beurteilung	Bestens geeignet für die mechanische Ernte , gute Verarbeitungsfrucht, hoher spezifischer Ertrag, nachteilig ist das schwache Wachstum.





Köröszer II	
Synonyme	Köröser Weichsel
Abstammung	Selektionszüchtung aus Ungarn
Entwicklungsstadium Ende April (Schnitt der Jahre)	Vollblüte
Blühzeitpunkt, Befruchtung	früh bis mittelfrüh, selbstunfruchtbar
Wuchseigenschaften	mittelstark – stark, geringe Verkahlung
Frucht	sehr groß, Beiblätter möglich, rötlichbraun, süß
Reifezeit (Schnitt der Jahre)	Anfang bis Mitte Juli
Beurteilung	Wohlschmeckende Frischmarktweichsel mit eher geringem Ertrag, für die Befruchtung sind andere Sorten unbedingt erforderlich.



Morellenfeuer	
Synonyme	Kelleris 16
Abstammung	aus einem frei abblühenden Sämling in Dänemark selektioniert
Entwicklungsstadium Ende April (Schnitt der Jahre)	beginnende Vollblüte
Blühzeitpunkt, Befruchtung	mittelfrüh, selbstfruchtbar
Wuchseigenschaften	mittelstark, aufrecht, dichte Krone
Frucht	mittelgroß, mittelfestes Fruchtfleisch, dunkel bis dunkelbraunrot, Saft stark färbend, bildet Stielblätter
Reifezeit (Schnitt der Jahre)	Mitte Juli
Beurteilung	Sehr gute Eignung für die Erzeugung von Direktsaft , kann bei sofortiger Verarbeitung geschüttelt werden, etwas platzempfindlich.



Vowi	
Synonyme	Vogtskirsche
Abstammung	Selektionszüchtung aus Deutschland, stammt wahrscheinlich von der Schattenmorelle ab
Entwicklungsstadium Ende April (Schnitt der Jahre)	Blühbeginn
Blühzeitpunkt, Befruchtung	mittelspät, selbstfruchtbar
Wuchseigenschaften	mittelstark, breite Krone, teils hängend, teilweise „Peitschentriebbildung“
Frucht	groß, mittelfestes Fruchtfleisch, dunkelbraunrot
Reifezeit (Schnitt der Jahre)	Ende Juli
Beurteilung	Exzellente Frucht für Destillate , kann bei sofort folgender Verarbeitung geschüttelt werden, eher hängender Wuchs.