

# Rotwein-Neuzüchtungen aus Weinsberg

## Cabernet Dorio, Cabernet Dorsa, Acolon

### Erntedaten

	Lesedatum	Stockertrag kg	durchschn. Traubengew. In g	Dichte °KMW	Säure g/l	Botrytis % Faulgut (geschätzt)
<b>2002</b>						
ACOLON	11.9.	0,89	183	17,5	7,1	50%
Cabernet DORIO	11.9.	1,35	175	19,3	6,5	15-20%
Cabernet DORSA	11.9.	1,61	208	18,5	6,8	5-10%
<b>2003</b>						
ACOLON	2.9.	1,23	230	20	5,3	
Cabernet DORIO	2.9.	1,08	140	21	5	
Cabernet DORSA	2.9.	1,41	216	21	5,5	

Acolon hat im Vergleich zu den anderen beiden Sorten eine deutlich kompaktere Traubenbeschaffenheit. Die Neigung zu Traubenfäulnis ist daher signifikant größer.

### Weinanalysen

#### 2002

	Alkohol vol%	Restzucker g/l	zuckerfr. Extrakt g/l	Titb. Säure g/l	Fl.Säure g/l
Cabernet DORIO	13,1	2,6	22,7	4,8	0,4
Cabernet DORSA	12,2	2,5	24,3	4,8	0,4
Acolon	12,8	2,7	23,1	4,9	0,5

#### 2003

Cabernet DORIO	14,4	1,7	23,8	3,1	0,6
Cabernet DORSA	14,0	2,2	27,5	4,0	0,5
Acolon	12,9	2,8	24,8	4,4	0,4

Cabernet Dorsa weist einen deutlich höheren zuckerfreien Extraktgehalt auf.

### Verkostungsergebnisse

