


Die Regulierung des Fruchtbehangs mit Hilfe der Volleinnetzung

Folgende 6 Varianten wurden in 4 Wiederholungen geprüft:


- 1.) Die Parzellen blieben während der gesamten Blütezeit eingenetzt. Das bedeutet, dass die Bienen/Hummeln die Blüten nicht bestäuben konnten.
- 2.) Das Netz wurde einen Tag nach dem Stadium BBCH 60 (Blühbeginn) herabgelassen.
- 3.) Das Netz wurde einen Tag nach dem Stadium BBCH 61 (10% der Blüten waren geöffnet) geschlossen.
- 4.) Das Netz wurde einen Tag nach dem Stadium BBCH 62 (20% der Blüten waren geöffnet) dichtgemacht.
- 5.) Das Netz wurde einen Tag nach dem Stadium BBCH 63 (30% der Blüten waren geöffnet) abgerollt.
- 6.) Diese Parzellen wurden nicht mit Netz versehen. Eine uneingeschränkte Bestäubung durch die Bienen/Hummeln war dadurch möglich.




Früchte Gala Buckeye® 2013




Blüte Gala Buckeye® 2014



Früchte Gala Buckeye® 2015



Blüte Gala Buckeye® 2016



Früchte Gala Buckeye® 2018

